

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

일반의약품  
분류번호 : 316

# 눈의 피로, 어깨결림 **큐피코와 i**

현대인들은 과도한 업무 및 컴퓨터, 스마트폰 등의 잦은 사용으로 쉽게 눈의 피로, 어깨결림 등의 증상이 나타나며 이러한 증상은 눈, 어깨의 근육 및 신경의 피로 등이 주요 원인입니다. 비타민B는 이러한 근육 및 신경 피로의 완화에 효과를 발휘합니다. 큐피코와아이정은 비타민B를 신체에 흡수되기 쉽도록 한 활성형 비타민B(벤포티아민)를 주성분으로, 마늘엑스가루, L-아스파라긴산마그네슘칼륨, 감마오리지놀 및 4종의 비타민을 동시에 배합하고 있습니다. 큐피코와아이정을 복용하시게 되면, 각종 유효성분이 상호작용하여 눈의 피로 및 어깨 결림, 근육통 등을 풀어 줍니다.

## [제품명] 큐피코와아이정

### [원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(500mg) 중

벤포티아민(KP) .....	46.1mg
리보플라빈(JP) .....	4.0mg
시아노코발라민1000배산(별규)(시아노코발라민으로서 20 $\mu$ g) .....	20.0mg
피리독신염산염(JP) .....	16.67mg
L-아스파라긴산마그네슘칼륨(별규) .....	100.0mg
마늘엑스가루(100→1)(별규) .....	20.0mg
$\gamma$ -오리지놀(KP) .....	3.33mg
토코페롤속시네이트칼슘(JP)(토코페롤속시네이트로서 16.67mg) .....	17.26mg

※ 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 뼈, 가죽)

## [성 상] 흰색의 원형 당의정

### [효능·효과]

- 다음 증상의 완화 : 눈의 피로, 근육통·관절통(어깨결림, 요통, 오십견 등), 신경통, 손발의 저림, 변비
- 다음 경우의 비타민 B의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 각기

### [용법·용량]

15세 이상의 소아 및 성인 : 1일 1회 2~3정 복용  
15세 미만 소아는 복용하지 말 것

### [사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
  - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 2) 고칼륨혈증 환자
  - 3) 심한 증상의 신부전 환자
  - 4) 15세 미만의 소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
  - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
  - 1) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
  - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
    - (1) 태어난 지 3주 이내 마우스 및 랫트에 아스파라긴산으로 250 mg/kg 이상을 투여하면, 시상하부 공상핵에 병리조직학적 변화를 확인했다는 보고가 있으므로 미숙아, 신생아, 젖먹이에게는 투여하지 않은 것이 바람직하다
  - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
  - 5) 신장장애 환자
  - 6) 저단백혈증 환자
  - 7) 알칼리증, 소화성궤양 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
  - 1) 이 약을 복용한 후 다음의 증상이 있을 경우



발진·발적, 가려움, 오심(구역), 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증


- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

#### 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 3) 비타민 B(리보플라빈)에 의해 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

#### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 고온을 피하여 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 4) 수분이 정제에 닿으면 정제의 표면이 변색되거나 균열을 일으킬 수 있으므로 물을 떨어뜨리거나 젖은 손으로 만지지 말 것. 잘못하여 정제가 젖은 경우에는 젖은 정제를 폐기할 것
- 5) 병 안의 비닐 충전재는 운송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위해서 넣은 것이므로 마개를 개봉한 후에는 반드시 버릴 것
- 6) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 말 것
- 7) 용기의 낙하 등 충격에 의해 정제에 균열이 생기게 되면 품질에 영향을 미칠 수 있으므로 케이스에 넣어 보관하는 등 취급에 주의할 것



**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**[포장단위]** 60정/병

**[사용기간]** 제조일로부터 36개월

※ 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 한국코와주식회사 홈페이지(<http://www.kowakorea.com>)나 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

**[제조자]** Kowa Company, Ltd., 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan

Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory, 18-57, Hatooka 2-chome, Kita-ku, Nagoya, Aichi, Japan

**[수입·판매자]**  **한국코와주식회사** 서울특별시 강남구 영동대로 302 7층

본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거하여 소비자의 정당한 피해에 대해 보상받을 수 있습니다.

전화번호 (소비자상담) 02-6930-4800 (수신자부담) 080-851-4800