

일반의약품
분류번호 : 233



식전 위장약

카베2코와과립

카베2코와과립은 소중한 위를 지켜주기 위한 식전 위장약으로, 더부룩한 증상이나 위의 팽만감을 예방합니다. 메틸메티오닌설포늄염화물(MMSC)과 감초엑스가루의 배합으로 위 점막 수복 효과가 있으며, 제산작용을 하는 수산화마그네슘, 건조수산화알루미늄겔 등의 첨가로 위 점막을 피복하여 점막 손상을 억제합니다. 또한, 인삼건조엑스 및 생약제제로 위를 보호하고 위 운동을 증진시키며, 식사 전 위를 편안하게 해 줍니다.
녹기 쉬운 과립제로서 복용이 용이하고, 회식할 때나 출장, 여행 시에 휴대하기 편리한 개별포장으로 되어 있습니다.

※ 메틸메티오닌설포늄염화물(MMSC)은 양배추 추출물 중의 항산화성케양인자로서 발견된 성분으로, 비타민U라고도 하며 위 점막 수복작용을 합니다.

[제품명] 카베2코와과립

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1포(1300mg) 중.

- 유 효 성 분 : 메틸메티오닌설포늄염화물(KP)..... 10mg
 감초엑스가루(별규) 25mg
 울금가루(JP) 100mg
 회향가루(JP) 66.6667mg
 정향가루(JP) 16.6667mg
 생강가루(JP) 16.6667mg
 인삼에탄올건조엑스(14.5→1)(별규) 6.6667mg
 수산화마그네슘(별규) 108.3333mg
 건조수산화알루미늄겔(JP) 150mg
 합성히드로탈시트(별규) 150mg
 벤포티아민(KP)..... 8.3333mg
- 기타 첨가제: 경화유, 옥수수전분, 자일리톨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 함수이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, L-멘톨

[성상] 백색 및 갈색의 과립제

[효능·효과]

식욕부진, 위통, 위산과다, 속쓰림, 소화불량, 위부불쾌감, 위부팽만감, 과식, 체합, 신트림, 구역, 구토

[용법·용량]

성인(15세 이상) : 1회 1포, 1일 3회 식전에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
투석요법을 받고 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
테트라사이클린계 항생제
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자

- 3) 부종(부기)이 있는 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 5) 인산염 저하가 있는 환자
 - 6) 고마그네슘혈증 환자
 - 7) 설사 환자
 - 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 9) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 10) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 3) 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우(저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있다)
 - 4) 이 약을 복용하는 동안 노력이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우
 - 5) 2주일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것
 - 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 중후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지할 것
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
 - 4) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30포(1포당 1.3g)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 한국코와주식회사 홈페이지(www.kowakorea.com)나 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

제조사 Kowa Company, Ltd., 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan
Kowa Company, Ltd., Fuji Factory, 332-1, Ohnoshinden, Fuji City, Shizuoka Pref., Japan

수입자  **한국코와주식회사** / 서울특별시 강남구 영동대로 302 7층

본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거하여 소비자의 정당한 피해에 대해 보상받을 수 있습니다.
전화번호 (소비자상담) 02-6930-4888 (수신자 부담) 080-851-4800

최종 개정연월일 : 2017년 10월 10일(제3판)

Y1223K 17K