

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

일반의약품

분류번호 : 329

자양강장, 육체피로엔

큐피코와골드알파정

큐피코와골드알파정(Q&P KOWA GOLD α Tablets)은 식물유래 자양강장 생약성분인 자오가(가시오가피) 건조엑스, 황기건조엑스, 마늘엑스가루와 피로에 도움을 주는 L-아스코르브산나트륨 등 비타민 6종이 동시에 함유되어 있어 피로에 효과가 있는 성분 보급 뿐만 아니라, 영양 공급을 통해 우리 몸에 활력을 불어 넣어 주는 종합영양제입니다.

특히 육체피로·병후의 체력저하·식욕부진·임신 수유기 등의 영양보급, 자양강장, 허약체질에 효과가 검증된 일반의약품으로, 바쁜 현대인을 위해 1회 1정, 1일 1~2회로 간편하게 복용할 수 있습니다.

[제품명] 큐피코와골드알파정

[원료약품 및 그 분량] 1정(500mg) 중

• 유효성분 : 자오가건조엑스(25→1)(별규)	6mg
황기건조엑스(8→1)(별규)	15mg
마늘엑스가루(100→1)(별규)	25mg
티아민질산염(JP)	5mg
리보플라빈(JP)	2mg
피리독신염산염(JP)	5mg
니코틴산아미드(JP)	12.5mg
L-아스코르브산나트륨(별규)	56.3mg
토코페롤숙시네이트칼슘(JP) (토코페롤숙시네이트로서 10mg)	10.35mg
L-아르기닌염산염(JP)	25mg
카페인무수물(JP)	25mg

• 첨가제(타르색소) : 황색5호

• 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 돼지, 사용부위 : 뼈, 피부)

• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무가루, 옥수수전분, 인산수소나트륨수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 정제백당, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스포비돈, 탈크, 폴리옥시에틸렌(105)폴리옥시프로필렌(5)글리콜, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[성 상] 이 약은 연한 노란 분홍(살구색)의 원형 당의정이다

[효능·효과]

육체피로·병후의 체력저하·식욕부진·영양장애·발열성소모성질환·임신수유기 등의 경우의 영양보급, 자양강장, 허약체질

[용법·용량]

15세 이상의 소아 및 성인 : 1회 1정을 1일 1~2회 복용

15세 미만은 복용하지 말 것

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 고혈압 환자
- 3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 4) 15세 미만의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 5) 디곡신 투여 환자(디곡신의 혈청농도를 증가시킬 수 있다)
- 6) 인슐린 투여 환자(인슐린의 효과를 증가시킬 수 있다)
- 7) 항응고제 투여 환자(항응고제의 효과를 증가시킬 수 있다)
- 8) 간질환 환자

9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약을 복용한 후 다음의 증상이 나타난 경우
 - ① 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - ② 소화기계 : 구역(오심) · 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 묽은 변
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다
- 5) 파리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다
- 7) 이 약을 과량 투여할 경우 우울증 환자를 더욱 우울하게 만들 수 있으므로, 1회 용량이 카페인으로서 500mg을 넘지 않도록 한다
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
- 4) 비타민 B2(리보플라빈)에 의해 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 오손을 피하여 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 4) 수분이 정제에 닿으면 정제의 표면이 변색되거나 균열을 일으킬 수 있으므로 물을 떨어뜨리거나 젖은 손으로 만지지 말 것
- 5) 병 안의 비닐 충전재는 운송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위해서 넣은 것이므로 마개를 개봉한 후에는 반드시 버릴 것
- 6) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 말 것
- 7) 용기의 낙하 등 충격에 의해 정제에 균열이 생기게 되면 품질에 영향을 미칠 수 있으므로 케이스에 넣어서 보관하는 등 취급에 주의할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 90정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 한국코와주식회사 홈페이지(<http://www.kowakorea.com>)나 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[제조자] Kowa Company, Ltd., 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan
Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory, 18-57, Hatooka 2-chome, Kita-ku, Nagoya, Japan

[수입자]  **한국코와주식회사** 서울특별시 강남구 영동대로 302 7층

본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거하여 소비자의 정당한 피해에 대해 보상받을 수 있습니다.
전화번호 (소비자상담) 02-6930-4800 (수신자부담) 080-851-4800

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017년 12월 3일(Ver.02)

Y1175R T7K