

일반의약품  
분류번호 : 264



외용 소염진통제

# 반테린코와 크림젤

[인도메타신, L-멘톨]

반테린코와크림젤은 근육이나 관절의 통증 및 염증을 완화시키는 성분인 인도메타신을 배합하여 일본 코와의 연구진이 독자적으로 개발한 크림상의 겔제제입니다.

반테린코와크림젤은 근육통·관절염등의 환부 피부 표면에 발랐을 때, 약제가 빠르게 흡수되어 끈적거리지 않고 냄새도 거의 남지 않습니다. 또한 반테린코와크림젤은 잘 찢어지지 않는 경제적인 라미네이트 튜브를 사용하여, 안쪽의 겔이 나오기 쉽고 미끄러지지 사용하기 쉽게 되어 있습니다. 집에서는 물론, 외출 시에도 사용하기 쉬운 장소를 가지고 있고 언제나 근육이나 관절의 통증을 치료할 수 있습니다.

원료약품 및 그 분량 1g 중,

- 유효성분 : 인도메타신(JP) ..... 10mg  
                  L-멘톨(JP) ..... 30mg
- 첨가제(동물유래) : 모노스테아르산소르비탄(기원동물:소, 사용부위:우지), 폴리소르베이트60 (기원동물:소, 돼지, 사용부위:우지, 돈지)
- 기타 첨가제 : 디아스프로판올아민, 아디판산디아스프로필, 아황산수소나트륨, 에데트산나트륨 수화물, 옥틸도데실미리스테이트, 이소프로판올, 정제수, 친유형글리세릴모노스테아레이트, 카르복시비닐폴리머, 히프로멜로오스


**성**    **상**    **황**    **색**    **크**    **림**    **상**    **의**    **겔**    **제**    **로**    **특**    **이**    **한**    **냄**    **새**    **가**    **있**    **습**    **니**    **다**    **.**

**효**    **능**    **·**    **효**    **과**    **다**    **음**    **질**    **한**    **및**    **증**    **상**    **의**    **진**    **통**    **·**    **소**    **염**    **(**    **항**    **염**    **)**    **:**    **퇴**    **행**    **성**    **관**    **절**    **염**    **(**    **골**    **관**    **절**    **염**    **)**    **,**    **어**    **깨**    **관**    **절**    **주**    **위**    **염**    **,**    **건**    **(**    **힘**    **줄**    **)**    **:**    **건**    **조**    **염**    **(**    **힘**    **줄**    **윤**    **활**    **막**    **염**    **)**    **,**    **건**    **주**    **위**    **염**    **,**    **상**    **완**    **골**    **상**    **과**    **염**    **(**    **테**    **니스**    **엘**    **보**    **우**    **등**    **)**    **,**    **근**    **육**    **통**    **,**    **외**    **상**    **후**    **증**    **청**    **(**    **부**    **기**    **)**    **:**    **동**    **통**    **(**    **동**    **중**    **)**


**용**    **법**    **·**    **용**    **량**    **일**    **1~4**    **회**    **적**    **당**    **량**    **을**    **환**    **부**    **에**    **바**    **르**    **니**    **다**    **.**

[용기의 올바른 사용법]

**1** 그림과 같이 노즐의 내부가 막혀져 있습니다.



**2** 처음 사용할 때는, 뚜껑 상부의 돌기부로 노즐의 구멍에 꽂아 내부 은박지 막힌 곳을 뚫어서 사용하십시오.



- 부드러운 제제이므로, 튜브를 강하게 누르면 제제가 튀어 나올 수 있으니 튜브를 강하게 잡지 말아 주십시오.
- 사용 후에는 노즐에 남은 약제를 깨끗하게 닦아내어 약제가 주변에 부착되지 않도록 주의하십시오.
- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오.

**사용상의 주의사항**

- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것**  
1) 이 약 또는 기타의 인도메타신 제제에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있습니다.) 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염진통제에 기관지경련의 병력, 비염 및 맥관부종을 일으킨 환자 4) 11세 미만의 소아 5) 임신 37주에 해당하는 임부(프로스타글란딘 합성저해로 인해 출산이 지연될 수 있으며 출산시 실혈, 신생아 출혈, 태아의 심폐독성(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능저하로 양수과소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있습니다.)
- 2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것**  
1) 눈 주위, 점막 등 2) 병변이 있는 피부(출혈성 피부질환, 습진, 옷 등에 의한 피부부, 감염된 병변, 화상, 상처부위 등) 3) 무중, 백선 등 또는 화농성 부위 4) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의합니다.
- 3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것**  
과량투여 시 쿠마린, 혈당강화제, 티록신과 상호작용이 나타날 수 있으므로 주의합니다.
- 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것**  
1) 기관지 천식 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있습니다.) 2) 건선 환자(증상이 악화될 수 있습니다.) 3) 의사에게 치료를 받고 있는 사람 4) 임부(임신 1기 및 2기) 5) 수유부 (영아에 대한 위해여부는 아직 밝혀진 바 없으나 이 약이 모유로 이행하므로 사용하지 않습니다.) 6) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 7) 약에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

**5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것**

1) 사용 후에 다음과 같은 증상이 발생한 경우 ① 가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 접촉 피부염, 습진(투여 중지시 증상이 소실됩니다.), 부기, 열감, 종창, 홍조, 아나필락시, 광과민증, 작열감(화끈감), 저극감, 건조감 및 저린감, 위장관 불쾌감, 두통, 어지러움 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부반응, 기관지경련, 속에 이르는 혈압하강 등의 과민 반응이 나타날 수 있습니다. 특수한 경우 두통, 구역, 구토, 열, 뒷목 뻐뻐함 또는 의식혼탁 등의 증상을 수반하는 무균성 뇌막염이 나타날 수 있습니다. ③ 수술 후에 생긴 상처에 바른 후 과민성 속이 나타났다는 보고가 있습니다.

2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

3) 인도메타신 경구제제의 과량 투여시 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있습니다.

① 위장관계 : 구역, 구토, 복부팽만감, 이급후중, 설사, 위장관 출혈 등 ② 정신신경계 : 중증 두통, 어지러움, 착란, 방향상실, 기면, 불면, 피로, 불안, 시각장애, 감각이상, 무감각, 경련 ③ 기타 : 저혈압, 호흡곤란, 창색증

**6. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것**

아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산 아니필락시와 같은 알레르기를 일으킬 수 있으며, 일부 감수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 전식발적을 일으킬 수 있습니다. 일반 사람에서의 아황산감수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산감수성은 비천식환자에서 빈번한 것으로 나타났습니다.

**7. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항**

1) 정해진 용법, 용량대로 사용합니다. (권장용량을 초과하여 장기간 넓은 부위에 바를 경우 전신부작용이 나타날 수 있습니다.) 2) 11세 이상의 소아는 보호자의 지도 감독하에 사용합니다. 3) 눈에 들어가지 않도록 주의합니다. 만일 눈에 들어간 경우에는 곧바로 충분한 양의 물로 씻어내고, 증상이 심한 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다. 4) 이 약을 사용한 후에는 손을 씻습니다. 5) 외용오로만 사용합니다. 6) 1주일에 50g을 초과하여 사용해서는 안됩니다. 7) 밀봉봉대법으로 사용하지 않습니다. 8) 장기 연용(계속 사용)해서는 안됩니다. 9) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의합니다. 10) 피부의 감염증이 은폐될 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 대해 이 약을 사용하는 경우에는 적당한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 신중히 투여합니다. 11) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또 환자 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의합니다. 12) 과량 경구투여시의 처치 ① 이 처치법은 대증적(증상에 대응하는) 보조요법입니다. 경구투여 후 시간이 오래 경과하지 않은 경우 위세척을 합니다. 자연 구토가 되지 않은 경우 구토유발제를 이용하며, 이외 같은 조치가 부적당한 환자의 경우 위세척을 실시합니다. 위를 비운 후 25 - 50mg의 약용탄을 투여합니다. 필요한 경우 혈청전해질 대체방법을 사용합니다. ② 기본적으로 물- 전해질 균형을 검사하여 조절하여야 하며 환자의 상태에 따라 철저한 의학적 관찰 및 유지요법이 필요할 수 있습니다. ③ 이 약의 부작용으로 인한 위장관 궤양과 출혈의 위험이 있으므로 수일간 모니터링 해야 합니다. 제산제를 사용하여 증상을 완화시킬 수 있습니다.

**8. 저장상의 주의사항**

1) 화기를 피하여 보관합니다.(이소프로판올 36% 함유) 2) 고온을 피해, 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다. 3) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다. 4) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

**포장당위** 35g/튜브

**저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**사용기간** 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 가능합니다.
- ※ 의약품용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 부작용보고 및 부작용피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

**제조사** Kowa Company Ltd., 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan  
Kowa Company Ltd., Fuji Factory, 332-1, Ohnoshinden, Fuji City, Shizuoka Pref., Japan

**수입자**  **한국코와주식회사** / 서울특별시 강남구 영동대로 302 7층

본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거하여 소비자의 정당한 피해에 대해 보상받을 수 있습니다.  
전화번호 (소비자상담) 02-6930-4800 (수신자부담) 080-851-4800

최종 개정연월일 : 2020년 03월 26일(제4판)